

**2008年5月改訂（第3版）
* 2006年3月改訂（第2版 薬事法改正に伴う改訂）

鎮痛、強心、利尿薬

アコニンサン錠

加工ブシ末製剤

日本標準商品分類番号
875900

貯法

室温保存（取扱い上の注意参照）。

使用期限

ラベル又は外箱に表示。

* 承認番号	14000AZZ03987000
薬価収載	1967年6月
販売開始	1967年7月



**【組成】

アコニンサン錠は、次の成分を含有する。

有効成分（1錠中）	添加物
日局加工ブシ末166.67mg	乳糖水和物 トウモロコシデンプン

*【性状】

かっ色の錠剤で、特異な芳香を有し、味は苦い。

外形 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)
 表 8.0 裏	 側面 4.0	200

【効能又は効果】

鎮痛、強心、利尿

【用法及び用量】

通常、成人1日量9錠を1日3回に分服する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 体力の充実している患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕
- (2) 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者〔心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

ブシを含む製剤との併用には注意すること。

3. 副作用

本品は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

その他の副作用

心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれることがある。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量する等注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

**【有効成分に関する理化学的知見】

日局加工ブシ末は、ハナトリカブトならびにオクトリカブトの塊根を加工処理して毒性を減じたものである。成分として、メサコニチン、ベンゾイルメサコニン、ベンゾイルアコニン等が含まれる。

【取扱い上の注意】

吸湿しやすいので、使用後は密栓し、直射日光を避け涼しいところに保管すること。

*【包装】

270錠（3錠×90）、900錠（3錠×300）、1,000錠