

この薬の名前は	商品名：セファランチン錠 1mg 英名：Cepharanthin 一般名：
	剤型：錠剤（直径6.0mm） 色：白色～微黄色 シート裏面等記載： 表：Cepharanthin tab.1mg CE/D 1mg 裏：セファランチン錠1mg,PVC,金属,プラ
この薬の働きは	炎症やアレルギーを抑え、症状を改善します。血液のほとんどの細胞に作用し、白血球の減少などを改善します。末梢血管の血流を良くし、脱毛などを改善します。
主治医に伝え忘れたことはありませんか	次のような人は使う前に主治医に相談してください。 以前にこの薬をのんで、発しん、かゆみなどが出たことのある人。 ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も） その薬について主治医に伝えてください。 妊娠または授乳中の場合 主治医にそのことを必ず伝えてください。
この薬の使い方	飲み方 必ず指示に従い、飲むときはコップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。 飲み忘れた場合 気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分は服用しないで、次の服用時間に1回分を飲んでください。 絶対に2回分を1度に飲んではいけません。 あやまって多く飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談してください。 高齢者の場合 特に主治医の指示を守って使用してください。 その他 主治医の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。
生活上の注意	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）	薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医に相談してください。 顔面蒼白、冷や汗、立ちくらみ、めまい、息切れ、意識消失、呼吸困難、じんま疹、全身のかゆみを伴った発赤、動悸、顔がほてって赤くなる、胸の不快感、喉頭浮腫、血圧低下 次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 顔や手足のむくみ、食欲がない、胃の不快感、吹き出物、はきけ、下痢、頭痛、かゆみ、めまい、月経不順 他にも何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。
その他（コメント）	
主治医の連絡先	
薬局の連絡先	

この薬の名前は	<p>商品名：セファランチン末1%</p> <p>英名：Cepharanthin 一般名：</p>
	<p>剤型：粉末（散剤） 色：白色～微黄色</p>
この薬の働きは	<p>炎症やアレルギーを抑え、症状を改善します。血液のほとんどの細胞に作用し、白血球の減少などを改善します。末梢血管の血流を良くし、脱毛などを改善します。</p>
主治医に伝え忘れたことはありませんか	<p>次のような人は使う前に主治医に相談してください。 以前にこの薬をのんで、発しん、かゆみなどが出たことのある人。</p> <p>ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も） その薬について主治医に伝えてください。 妊娠または授乳中の場合 主治医にそのことを必ず伝えてください。</p>
この薬の使い方	<p>飲み方 必ず指示に従い、飲むときはコップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。</p> <p>飲み忘れた場合 気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分は服用しないで、次の服用時間に1回分を飲んでください。 絶対に2回分を1度に飲んではいけません。</p> <p>あやまって多く飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談してください。</p> <p>高齢者の場合 特に主治医の指示を守って使用してください。</p> <p>その他 主治医の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。</p>
生活上の注意	
この薬を使ったあと 気をつけていただくこと (副作用)	<p>薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医に相談してください。 顔面蒼白、冷や汗、立ちくらみ、めまい、息切れ、意識消失、呼吸困難、じんま疹、全身のかゆみを伴った発赤、動悸、顔がほてって赤くなる、胸の不快感、喉頭浮腫、血圧低下</p> <p>次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 顔や手足のむくみ、食欲がない、胃の不快感、吹き出物、はきけ、下痢、頭痛、かゆみ、めまい、月経不順</p> <p>他にも何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。</p>
その他 (コメント)	
主治医の連絡先	
薬局の連絡先	